

n^o 91.

De La formati- on Du fœtus

Quoique des
tous ceux qui admettent
l'opinion des œufs dans la
la generation des vivipars
qui a trouvé bien des par-
tisans, Robert de Graaf
en le seul qui dise les
les avoir remarqués dans
l'ovaire; & Haller dans la
huit cent vingt cinquième

ARC 25d 81



article de la physiologie, qui
 semble être de même avis —
 dit expressément: & s'il ne
 faut pas user de dissimula-
 tion j'avouerai de bonne foi
 que personne n'a osé avouer
 les avoir vus. en effet pour
 le peu qu'on jette les yeux
 sur la structure des trompes
 de fallope, & des ovaires, si
 l'on fait attention sur le
 mécanisme qui doit résulter
 de cette structure, on verra
 sans peine que la formation
 de tous les vivipars se forme
 plutôt de l'union des deux
 semences des deux sexes

que par le développement
de l'espèce renfermée dans
un œuf

En considérant la
structure des trompes de
fallope, on trouvera que
que l'ouverture de son con-
duit qui aboutit au fond de
la matrice est beaucoup plus
étroit que celui qui aboutit
au morceau frangé; le qui
paroît plutôt destiné à
l'éjaculation de la semence
qu'au transport d'un œuf
dans la matrice; car comme
toutes les opinions se réunis-
sent à croire, qu'au moment



Du côté surtout de celui qui
 opere la generation, le
 morceau frangé de la trompe,
 embrasse l'ovaire, le presse,
 pour en detacher soit l'œuf,
 soit la semence pour être
 conduit dans la matrice pour
 s'y développer aussi en ad-
 mettant l'opinion des œufs ; -
 je trouve que la semence de
 l'homme après avoir traversé
 le fond de la matrice, en
 passant par la petite ou-
 verture de la trompe se
 trouve r'arrestée dans la
 courbe par l'elargissement
 de le canal qui offre plus

L'espace doit nécessairement
 s'attendre sous activité & fait
 qu'etant parvenu a l'ovaire
 il doit rester sans action -
 ou du moins ne lui en laisser
 que fort peu pour penetrer
 l'auf & le féconder; L'
 allieur l'auf sortant de
 l'ovaire doit en parcourant
 le conduit unique de la
 trompe pour se rendre dans
 le fond de la matrice
 trouver un obstacle d'autant
 plus grand qu'il avance
 d'avantage vers le visere
 & si par le mechanisme qui
 doit résulter de la structure



de la trompe, l'œuf étant
poussé d'une large ouverture
par une plus petite doit
nécessairement être poussé
avec violence tomber de la
matrice qui n'aura sûrement
pas le temps de se refermer
après cette pour en empêcher
la sortie

En admettant l'opi-
nion des œufs, on trouve
en leur une difficulté dans
l'explication de l'abouchement
des vaisseaux utérins
avec ceux de l'arrière faire
car l'œuf devant être
revêtu d'une membrane lisse



7
de poliee garnie de pores suffi-
fisans pour relevoir l'esprit
seminal qui doit se feconder
Comment pourra-t-il fournir
les vaisseaux necessaires pour
former cette communication
de la mere a l'enfant, le
qu'il en plus aisie d'ex-
pliquer par l'union des
deux semences, ainsi que
nous le dirons plus bas.

La jonction de deux
ou plusieurs arrieres fait
tandis que les foetus se
trouvent chacun dans son
enveloppe particuliere n'en
pas d'une moindre difficulte



8
à expliquer dans l'opinion
des œufs, car en effet par
quelque liaison de pour faire
cette jonction leur membrane
étant glisse & polie

l'opinion qui admet
la formation des vivipars
par la jonction des deux
semences paroit plus conforme
au mécanisme qui doit resul-
ter de la structure des
parties destinées à cette su-
blime opération.

lorsque par la jone-
tion des deux sexes, la
semence du mâle s'jacte
dans le fond de la matrice

la frange de la trompe
 de fallope, embrasane très
 étroitement à l'ovaire, en
 exprime, par la pression
 qu'elle y fait, la matière
 seminale pour être jaculée
 dans le fond de la matrice
 où elle rencontre celle du
 mâle pour former l'individu
 de son espèce. en effet la
 trompe étant faite en cône
 dont la base est appuyée
 sur l'ovaire dans la copu-
 lation, semble par cette
 disposition faite pour tenir
 ce qu'elle contient. de plus
 ce qui peut enlever favoriser
 cette opinion, c'est qu'on —



peut regarder la semence
 du mâle comme contenant
 l'espèce & celle de la fe-
 melle la matière capable
 de lui donner son premier
 accroissement; de même
 qu'une graine n'attend
 qu'une terre propre pour
 son développement & des
 sucs suffisants & analogues
 pour son accroissement;
 de même aussi la semence
 du mâle n'a besoin pour
 son développement que la
 chaleur naturelle qu'elle
 rencontre dans la matrice
 & de la semence de la
 femelle pour son premier

accroissement, le fœtus ayant
 besoin par la suite d'une
 nourriture plus abondante
 que lui procure l'abbou-
 chement des vaisseaux utérins
 avec ceux de l'arrière
 fais qui sont produits par
 le développement des vaisse-
 aux contenus dans la semence
 de la femelle, qui dans la
 contraction qui arrive à la
 matrice dans les premiers
 temps de la grossesse, qui
 l'impriment si je peux m'exp-
 pliquer ainsi les premiers
 éléments de l'individu qui
 doit en résulter irrê-
 nement



rement les vaisseaux utérins,
 (Ce qui est prouvé par de
 légères douleurs que sentent
 les femmes aux environs de
 l'ombilic les premiers tems -
 de leur grossesse,) cette irri-
 tation excite de malgré une
 inflammation qui forme cette
 adhérence si utile pour faci-
 liter la nutrition, & l'al-
 croissement de l'espèce, jus-
 qu'au terme de l'accouche-
 ment. on objectera peut-être
 qu'on a trouvé des embryons
 dans les trompes & les ovaires
 mais c'est une preuve de plus
 contre le sentiment des œufs

Car si c'étoit un œuf fécondé
 comment à-t-il pu faire -
 adhérence avec les vaisseaux
 des trompes ou leur des
 membranes qui forment l'ovaire
 n'est-il pas plus facile de
 croire que la semence du
 mâle ayant pénétré par le
 conduit de la trompe a
 rencontré celle de la femelle
 dans son passage ou qu'étant
 parvenus jusque dedans l'ovaire
 d'où la trompe n'avoit par-
 tior. Detaché, celle de la
 femelle. faiblisse y a trouvé une
 chaleur suffisante, & une
 matière propre à son développ-
 pement.

pement; les vaisseaux contenus
 dans la semence de la femelle
 ne s'espacent pour former les en-
 veloppes & l'arrière fait pour
 servir à cette communication
 si ne s'espacent à l'allongement
 de l'embryon, occupant plus
 de volume par leur premier
 allongement, pressent de
 ne s'espacer les parties voisines
 y existe une inflammation
 d'après la quelle se forme
 cette adhérence aux parois
 soit de la trompe soit de
 l'ovaire, mais comme les
 vaisseaux sont trop petits
 pour pouvoir fournir au fœtus
 une nourriture suffisante

Dans son allvoisement l'
embriou en de toute neapilt
reduit a perdre la vie faute
d'aliments

EN OUVRAIT une
môle ou troue dans le fond
une espee de glaire blanche
nageant dans une serosite
limpide; le glaire ou
pretendu tel n'en autre
chose que la matiere seminale
du mâle etouffé par quel
que cause que le puipectre
peut prouver que l'espee
en continue dans la semence
du mâle; l'allvoisement de
la môle prouve de meme



que les vaisseaux du placenta
qui s'abouchent aux vaisseaux
utérins, sont véritablement
contenus dans celle de la
femelle.

Ce qui prouve le
plus que l'individu en
contenus dans la semence
du mâle, c'est qu'elle seule
est spiritueuse, celle de la
femelle étant muco-lagineuse
prouve qu'elle est plus
propre à le nourrir & à
le conserver. en outre c'est
que sans s'arrêter à
considérer que les enfans-
participent plus de leur

pere que de leur mere, &
 que les enfans qui naissent
 d'un pere vieillard, & d'une
 jeune mere; participent
 de la caducité de leur pere
 quoi qu'il aient reçu la
 nourriture & l'élevage
 d'une mere dont la jeu-
 nesse auroit dû prevaloir
 sur la vieillesse du pere.
 Si l'individu étoit in-
 valable dans la semence
 ou prétendu œuf de la mere
 ou en si l'ouvrière de cette
 verité que l'on par les
 mâles qu'on cherche à se
 procurer une belle espèce —



Dans les animaux —————

Nimar M^t en chi.

à Souvions porceline

près Bethel —————



De la fièvre De lait

La fièvre de lait qui
attaque le troisième jour —
de l'accouchement presque —
toutes les femmes, & contre
la qu'elle n'est autre que
moins que je sache n'a donné
aucun remède, ne devoit pas
si à braver, si on faisoit
attention aux symptômes qui
l'occasionne.



Les Glandes des mamelles
 ne contenant, (même des les
 derniers temps de la grossesse)
 qu'une sérosité aigre & acide
 la qu'elle retient dans les
 glandes, lorsque le troisième
 jour après l'accouchement,
 que le plus gros des lochies
 est évacué, la matière lactée
 se porte en abondance dans
 cette partie, s'insinue dans
 les glandes mammaires ou
 séjourne cette humeur acide,
 il s'y trouve par son mélange
 coagulé, cette coagulation qui
 arrive de necessity obstrue les
 susdites glandes, & le lait.

toutes les parties cette sensation
 qu'on nomme fièvre de lait
 ON S'EN CONTENTE jus-
 qu'aujourd'hui de réduire les
 nouvelles allouées à une diète
 exacte, pour dit-on prévenir
 l'abondance du lait; si l'abon-
 dance du lait étoit la véritable
 cause de cette fièvre, on la
 verroit arriver à toutes les bonnes
 nouvelles, donc l'abondance du
 lait est si grande, qu'il
 s'écoule de lui même sans sue-
 lion, ni pression. mais bien
 loing que la diète soit un
 préservatif contre la fièvre de
 lait, elle est plus propre à

L'augmenter qu'à la reprimer,
 en diminuant le ressort des
 vaisseaux, donc la foiblesse
 loing d'aider, par des oscillations,
 la matiere lactee de penetrer
 dans les glandes mammaires —
 lui en au contraire d'un grand
 obstacle.

L'accouchement etant
 etant une chose toute naturelle,
 il est ridicule de traiter l'ac-
 couchée, comme une femme
 malade; l'accouchement etant
 une travail, il est donc plus
 a propos de traiter celle qui
 l'a eue comme une personne
 fatiguée. or si vous reduisiez à



ainsi coagulé forme un obstacle
 à la distribution de celui qui
 doit lui succéder ; le quel —
 trouvant de la résistance, hâte
 sans cesse contre les glandes
 obstruées, gêne en conséquence
 les fibres nerveuses que le travail-
 lement irrite y fait affluer les
 esprits vitaux qui les gonflent
 en conséquence compriment les
 vaisseaux sanguins dont la
 vitesse augmente, le rapport
 sympathique, si je puis m'exprimer
 ainsi des nerfs de toute l'habitude
 du corps, communiquant bientôt
 dans toutes les parties de
 même irritation, coagulent dans



La Diète une personne fatiguée
 il ne s'ensuit que vous la jette
 riez dans l'affaiblissement, l'ur-
 t qui une femme nouvellement
 accouchée, que l'on traite comme
 malade, pour prévenir une
 maladie qu'on ne peut éviter
 qu'on en ait reconnu la
 cause. or comme cette cause
 ne réside point dans l'abondance
 du lait, mais dans l'acreté
 de cette matière serueuse qui
 séjourne dans les glandes où
 il doit se distribuer, ~~et~~ où
 il se coagule, l'ur donc dans
 l'évaluation de cette humeur
 qu'il faut chercher le moyen
 d'éviter une maladie qui-

Souvent a occasionné des ravages
considérables.

Pour évacuer cette
serosité alvé des glandes der-
mamelles, il suffit de présenter
le sein à l'enfant nouveau
né, dip ou deux heures après
l'accouchement, sans attendre
le troisième jours, par le
moyen de vos suides les mar-
melles de cette serosité alvé
le lait qui y abonde le
troisième jours, ne trouvant
aucun obstacle a sa distri-
bution dans cette partie, ny
apporte aucune altération.
l'enfant lui même en reçoit



une autre avantage ; cette ma-
tiere serreuse lui servant de
purgatif pour lui faire jeter
le meconium au dehors.

Ce seroit un grand-
avantage pour elle-même
dout le temperament ou la
délicatesse, empêche de nourrir
leurs enfans, de leur donner
le sein, au moins sept ou
huit fois, pour evacuer cette
humour acide des leurs
mamelles, ou au moins de les
faire vider par la garde-
avant d'y appliquer des
resolutifs,

C'est la methode
dont je me sers depuis outre

que j'exerce l'art des accou-
 cheurs, & je suis sûr que
 dans le grand nombre de
 lettres que j'ay allouchées, il
 n'y en a pas une de celles
 qui ont observées cette pratique
 qui aient éprouvé la fièvre de
 lait, quoiqu'il leur ait ac-
 cordé une nourriture beaucoup
 substantielle que celles qu'elles
 étoient dans l'usage de pren-
 dre dans leur meilleure —
 santé; & presque toutes se sont
 trouvées en état de se lever
 même de se promener dans
 la chambre dès le troisième



jour qui paroit si redoutable.

je n'entend pas —

dire qu'on ne doive pas —

refuser toutes nouritures à

celles à qui il survient des

accidens; au contraire, celles —

les doivent être traitées suivant

les Symptômes qui accompa-

gnent leur touche, n'enten-

dant parler que de celles

qui sont naturelles, ou exemptes

d'accidens.

Fir Vimar et^{te} mch.

1773

a nouveau porcion
pres rethel

~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~



